Algoritmo diagnostico

Trattamento di valori moderatamente fuori dalla norma di ALT e AST

Aumento inferiore a cinque volte il normale di ALT e AST

↓

Anamnesi ed esame fisico; sospensione di farmaci epatotossici e alcool

↓

Verificare nuovamente i valori se si sospetta un errore

↓

Transaminasi, tempo di protrombina; albumina; emocromo e piastrine, sierologia per l'epatite A, B e C; sideremia; capacità totale legante il ferro; ferritina.

↓

Valutazione accelerata ← Sierologia negativa. Evidenza di malattia cronica epatica o scompenso epatico

Se non nella norma, procedere con valutazione diretta e trattamento

↓

Sierologia negativa, paziente asintomatico senza scompenso epatico

↓

Cambiamenti dello stile di vita: sospensione di farmaci epatotossici e alcool, riduzione del peso e controllo del diabete

↓

Follow-up a sei mesi

↓

Ripetizione delle transaminasi → normale → osservazione

↓

Non nella norma

↓

Eco epatica e sierologia, anticorpi antinucleo, anticorpi anti-cellule muscolari liscie, ceruloplasmina, alfa$_1$-antitripsina, anticorpi antigliadina e antiendomisio

↓

Biopsia epatica